



Hioscyna jest lekiem działającym rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, jej podanie przed badaniem MR osłabia perystaltykę (ruchy jelit) i pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazów.

CZY WYSTĘPOWAŁY U PANI:

Jaskra zamkniętego kąta przesączenia?	TAK	NIE
Zaburzenia rytmu serca (inne niż migotanie przedsionków)	TAK	NIE
Choroba niedokrwienia serca?	TAK	NIE
Choroby przewodu pokarmowego (jeśli tak, jakie?)	TAK	NIE
Myasthenia gravis?	TAK	NIE
Czy w przeszłości występowały reakcje uczuleniowe na atropinę lub hioscynę?	TAK	NIE

Data ostatniej miesiączki:.....



Lek rzadko może powodować przejściowe zaburzenia ostrości widzenia, zwykle ustępujące w ciągu 45 minut. W przypadku wystąpienia tych objawów należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych do czasu ich ustąpienia.

Wyrażam zgodę na domięśniowe podanie hioscyny:
TAK/NIE

Podpis pacjentki:

Podpis lekarza nadzorującego badanie:

Podpis pielęgniarki:.....